



Operasyondan önce: Staphylococcus aureus bakterilerini azaltmak için tedbirler

Tedbirlerin hedefi, deri ve mukoza üzerindeki staphylococcus aureus bakterilerinin sayısını azaltmaktır. Böylelikle, operasyon sonrası bir yara enfeksiyonu riskinin azaltılabildiği kanıtlanmıştır. Tedavi bütün olarak beş günlük öngörülmüştür ve ideal durumda planlanan operasyondan önce tamamlanmış olmalıdır.

Eğer bu mümkün değilse tedbirler, müdahaleden sonra başlanır veya sürdürülür.



- ☒ Her gün dezenfekte edici sabunla (örn. Lifoscrub®) duş alın ve saç yıkayın.
İki dakika etki süresinden sonra su altında durulayın.
Bunun ardından normal bakım ürünleri kullanılabilir.
- ☒ Alternatif olarak, dezenfekte edici banyo eldivenleri (örn. SinAqua® %2 klorheksidin) de kullanılabilir.



- ☒ Günde 2 kez burun merhemi (örn. Bactroban®) uygulayın.
Her bir burun deliğine bir pamuklu çubukla ya da parmak ucuyla yaklaşık kibrit başı büyüklüğünde bir miktar sürün.



- ☒ Günde 2 kez diş fırçalama sonrasında ağızınızı yıkayın ve gargara solüsyonuyla (örn. Dentohexin®) gargara yapın.
Solüsyon musluk suyuyla 1:1 oranında seyreltilmelidir.

