



Prima dell'intervento chirurgico: misure per la riduzione dei batteri *Staphylococcus aureus*

L'obiettivo delle misure è diminuire il numero di batteri *Staphylococcus aureus* presenti sulla cute e sulle mucose. In questo modo è possibile ridurre in modo dimostrabile il rischio di infezione della ferita dopo un intervento chirurgico. Il trattamento è previsto per un totale di cinque giorni e dovrebbe idealmente concludersi prima dell'intervento chirurgico programmato.

Se ciò non fosse possibile, le misure saranno avviate o proseguite dopo l'intervento.



- ☒ Fare la doccia e lavare i capelli ogni giorno con il sapone disinfettante (ad es. Lifoscrub®).
Lasciar agire due minuti, quindi risciacquare sotto la doccia.
Dopo è possibile utilizzare i consueti prodotti per la cura.
- ☒ In alternativa si possono utilizzare guanti disinfettanti (ad es. SinAqua® clorexidina 2%).



- ☒ Applicazione 2 volte al giorno dell'unguento nasale (ad es. Bactroban®).
Con un bastoncino ovattato o il polpastrello applicare in ogni narice una quantità grande quanto la capocchia di un fiammifero.



- ☒ Sciacquare la bocca e fare i gargarismi con una soluzione per collutorio (ad es. Dentohexin®) 2 volte al giorno dopo aver lavato i denti.
La soluzione deve essere diluita in rapporto 1:1 con acqua di rubinetto.

