

Перед операцией: Меры о снижению количества бактерий золотистого стафилококка (*Staphylococcus aureus*)

Цель этих мероприятий — снизить количество бактерий золотистого стафилококка на коже и слизистых оболочках. Доказано, что эти меры снижают риск инфицирования ран после операции. Процедуры рассчитаны на пять дней и в идеале должны быть завершены до запланированной операции.

Если это невозможно, то такие действия необходимо начать или продолжить выполнять после операции.




- ✓ Ежедневно принимать душ и мыть волосы дезинфицирующим мылом (например, Lifoscrub®).

Длительность воздействия две минуты.

После этого моющее средство необходимо смыть. Дальше можно использовать обычные средства по уходу.

- ✓ В качестве альтернативы можно использовать дезинфицирующие рукавицы для мытья тела (например, SinAqua® 2%-ный хлоргексидин).



- ✓ Два раза в день наносить назальную мазь (например, Bactroban®).

Наносите небольшое количество мази объемом со спичечную головку в каждую ноздрю с помощью ватной палочки или кончиком пальца.



- ✓ Два раза в день после чистки зубов полоскать рот и горло ополаскивателем для полости рта (например, Dentohexin®).

Раствор следует разбавить водопроводной водой в соотношении 1:1.