

Die spezielle Thromboselokalisierung


Daniel Staub

Angiologie


Universitätsspital Basel

daniel.staub@usb.ch


Verteilungsmuster der Venenthrombosen



Spezielle Lokalisationen – ungewöhnliche Lokalisation



Häufigkeiten der Lokalisation venöser Thrombosen









Thrombose V. portae
bei/mit Aneurysma


✦ Abstand 3.92 cm





Ovarialvenen - Thrombose






Septische Thrombose V. jug. int.

Venenthrombose ungewöhnlicher Lokalisation

- Venenthrombose im Splanchnikus-Gebiet
 - Pfortaderthrombose / Portalvenenthrombose
 - Mesenterialvenenthrombose
 - Milzvenenthrombose
 - Budd-Chiari Syndrom (Lebervenenenthrombose)
- Cerebrale Venenthrombosen (Sinusvenenthrombosen)
- Ovarialvenenthrombose
- Nierenvenenthrombose
- (Jugularvenenthrombose)
- (Retinalvenenthrombose)

Venenthrombose im Splanchnikus-Gebiet



Pfortaderthrombose:

Inzidenz 3.8/100'000/Jahr bei Männer
Inzidenz 1.7/100'000/Jahr bei Frauen
2-16% der Patienten mit Leberzirrhose

Mesenterialvenenthrombose

Inzidenz 2.7/100'000/Jahr
Inzidenz 11/100'000/Jahr bei >70-jährigen



Milzvenenthrombose

Inzidenz unklar (10% bei Pancreatitis)

Budd-Chiari Syndrom (Lebervenenenthrombose)

Inzidenz 2/Mio/Jahr

Venenthrombose im Splanchnikus-Gebiet



Pfortaderthrombose:

Symptome sehr variabel

Chronisch: Portale Hypertension, Aszites, Blutung

Akut: Fortsetzung in V. mes. superior mit Schmerz bei Darmischämie

Mesenterialvenenthrombose


Akut/subakut: Schmerz, Erbrechen, Diarrhoe, Obstipation, Ileus

Chronisch: GI-Blutung


Budd-Chiari Syndrom (Lebervenenenthrombose)

Oberbauchschmerzen, Aszites, Hepato-Splenomegalie und Leberfunktionsstörung, leichter Ikterus, fulminantes Leberversagen

Therapie bei Venenthrombose im Splanchnikus-Gebiet



Cerebrale Venenthrombosen (Sinusvenenthrombosen)



Erwachsene

Inzidenz 3-4/Mio/Jahr

Neugeborene

Inzidenz 5-7/Mio/Jahr

2/3 aller Fälle mehr als ein Sinus

0.5-1% aller Strokes

Frauen: Männer = 3:1

Cerebrale Venenthrombosen (Sinusvenenthrombosen)




Durale Sinusvenenthrombose

Kopfschmerzen

Bei intrazerebraler Druckerhöhung:
Übelkeit, Erbrechen, Verlangsamung,
Sehstörung (Papillenödem)

Kortikale Venen


Kopfschmerzen, fokale epileptische Anfälle,
zT. fluktuierend fokal neurologisches
Defizit (Hemiparese, inkomplette
Hemianopsie und Aphasie)



Verlauf:

- 1/3 akuter Beginn
- 1/3 subakut (48h)
- 1/3 chronisch (>4 Wochen)

Therapie bei Cerebraler Venenthrombosen (Sinusvenenthrombosen)






Therapie bei UST mit DOAC


	Before IPTW		
	Warfarin (N = 514)	Rivaroxaban (N = 574)	SMD
Diagnose (%)			
Splanchnic Vein Thrombosis	376 (73.15)	340 (59.23)	0.485
Cerebral Venous Thrombosis	107 (20.82)	105 (18.30)	
Upper Extremity Deep Vein Thrombosis	31 (6.03)	129 (22.47)	

Clinical Outcomes	Weighted IR per 100 PY			HR(95%CI)	P
	Warfarin	Rivaroxaban			
Recurrent VTE	1.26	1.13		0.52(0.25–1.08)	0.081
Bleeding complications	1.35	0.60		0.30(0.14–0.60)	0.001
Major Bleeding	0.84	0.40		0.33(0.13–0.74)	0.009

0.1 1 20
Favor rivaroxaban Favor warfarin



Ovarialvenenthrombose



Natürliche Geburt


1 pro 9000 Geburten

Sectio postpartal

1 pro 800 Sectios

Inzidenz ausserhalb der
Schwangerschaft unbekannt
(Einzelfallberichte)

Ovarialvenenthrombose



- Postpartal 2. – 4. Tag
 - Unterbauchschmerzen
 - subfebrile Temperaturen
 - palpatorisch, schmerzhafter Tumor im Unterbauch
 - Komplikation:
Lungenembolie, Septikämie
- Ausserhalb der Schwangerschaft
 - zT. asymptomatisch und Zufallsbefund

Nierenvenenthrombose

Sehr selten (genaue Inzidenz unklar)




**Tabelle 1. Ursachen einer Nierenvenenthrombose:
Einteilung nach Virchow'scher Trias.**

Endothelschaden	Trauma
	Infiltration durch Tumor Nierentransplantatabstossung iatrogen: im Rahmen einer Angiographie oder Operation
Hyperkoagulabilität	Im Rahmen eines nephrotischen Syndroms
	Orale Antikonception
	Paraneoplastisch
	Angeborener Gerinnungsdefekt
	Antiphospholipid-Antikörper-Syndrom
Stase	Hypovolämie
	Schwere Blutung
	Kompression von aussen (retroperitoneale Tumoren)
	Abknickung der Vene
	bei Transplantatnieren

Nierenvenenthrombose




Tabelle 2. Präsentation einer Nierenvenenthrombose je nach Dynamik und Ausdehnung.

	Akuter (totaler) Verschluss	Gradueller (partieller) Verschluss
Ätiologie	Z.B. Dehydratation (Neugeborene) Selten beim nephrotischen Syndrom	Z.B. Infiltration/Kompression durch Tumor Häufig beim nephrotischen Syndrom
Komplikation	Niere: Schwellung, hämorrhagischer Infarkt Systemisch: Gefahr einer Thromboembolie	Niere: Minimale Schädigung wegen Blutabflusses via Kollateralen Systemisch: Gefahr einer Thromboembolie
Klinik	Akuter Flankenschmerz, Makrohämaturie, evtl. palpabler Tumor (Kinder)	Oligo-, asymptomatisch
Labor	Erhöhte LDH Erhöhtes Kreatinin Mikro-/Makrohämaturie	–

Konklusion

- Die Thrombosen an ungewöhnlichen Lokalisationen (unusual site thrombosis) sind selten aber oft klinisch relevant
- Das klinische Erscheinungsbild ist sehr vielfältig
- Bildgebung mit Ultraschall schwierig, oft CT oder MRI notwendig
- Häufig spezifische Risikofaktoren
- Aufgrund der kleinen Fallzahlen fehlen randomisierte Studien für die Festlegung der optimalen Therapie sowie Art und Dauer der Antikoagulation

Vielen Dank

Für ihre Aufmerksamkeit!

